

Caractéristiques :

Couleur fleur :

Couleur feuillage : Vert

Hauteur : 0 cm

Feuillaison : aucune

Floraison(s) : aucune

Type de feuillage : caduc

Exposition : soleil

Type de sol :

Silhouette : Non prÃ©cisÃ©



AUBERGINE 'Black Beauty'

-> [Accéder à la fiche de AUBERGINE 'Black Beauty' sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)

DESCRIPTION

Informations botaniques

Nom botanique : AUBERGINE 'Black Beauty'

Famille : Solanaceae

Description de AUBERGINE 'Black Beauty'

(Solanum melongena) Famille des solanacées. Originaires d'Inde l'aubergine est une des plantes potagères qui a le plus besoin de chaleur. Cette variété ancienne mi-précoce, produit des fruits en forme de massue de couleur noire d'environ 400g à 1 kg. Exigeante, la culture d'aubergine n'est pas la plus simple au potager.

Disponible début avril à mi-juin.

Entretien de AUBERGINE 'Black Beauty'

Comme la tomate, l'aubergine se taille. Cela permet d'obtenir une production plus précoce. Au-dessus de la deuxième fleur tailler la tige principale. Des tiges secondaires vont alors se former et des fleurs vont apparaître. En région fraîche l'été, couper la tête de ces ramifications après la première fleur et en région plus douce après la deuxième. La taille s'effectue de juin à septembre. Tout au long de la culture arrosez régulièrement au purin d'ortie de préférence le matin. Surveiller la présence de botrytis, mildiou, araignées rouges, pucerons et aleurodes (mouches blanches). Le botrytis ou pourriture grise, est un champignon qui se développe par temps humide et doux (15 à 20°C). S'il apparaît tôt dans la saison c'est que l'arrosage est excessif. Il faut donc le réduire et pulvériser une solution à base de préle. Cette pulvérisation sera aussi préventive en cas d'attaque de mildiou (taches brunes sur les feuilles et feutrage blanc en dessous). Dans un environnement trop sec les plants d'aubergines sont souvent la cible des araignées rouges. En cas de présence de ces dernières pulvériser de l'eau sur les feuilles pour maintenir un taux d'humidité et éviter la prolifération. Si l'attaque est trop importante pulvériser une solution à base de pyrèthre végétale. Faites aussi attention aux doryphores, pucerons et aleurodes qui aiment beaucoup l'aubergine.

La récolte s'effectue environ 2 mois après plantation pour les variétés les plus précoces et 3 mois pour les tardives.

EMPLACEMENT

Emplacement de AUBERGINE 'Black Beauty'

Type de sol de AUBERGINE 'Black Beauty'

PARTICULARITÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

-> [Accéder à la collection des Toutes les plantes disponible à la vente sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)