

## Caractéristiques :

Couleur fleur :

Couleur feuillage : Vert

Hauteur : 0 cm

Feuillaison : aucune

Floraison(s) : aucune

Type de feuillage: persistant

Exposition : soleil

Type de sol :

Silhouette : Non précisée



## COURGETTE 'Black Beauty'

-> [Accéder à la fiche de COURGETTE 'Black Beauty' sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)

### DESCRIPTION

#### Informations botaniques

Nom botanique : COURGETTE 'Black Beauty'

Famille : Cucurbitaceae

#### Description de COURGETTE 'Black Beauty'

(Cucurbita pepo) Famille des cucurbitacées. Variété précocée non coureuse (elle garde un port buissonnant). Appelée aussi 'Verte de Milan'. Variété classique aux fruits verts foncés et brillant de 16 à 20cm. Très productive sa chair est fine, savoureuse et fondante. Les fleurs mâles peuvent être consommées en beignets ou farcis. Elle est apte à la congélation et polyvalente en cuisine. La production de courgette réussit très bien en Bretagne que ce soit en plein champ ou sous tunnel.

#### Entretien de COURGETTE 'Black Beauty'

Facile de culture la courgette ne demande pas de soin particulier. Il faut seulement surveiller l'apparition de l'oïdium ainsi que la bonne pollinisation des fruits. Comme toute cucurbitacée la courgette est allogame, c'est à dire qu'elle produit des fleurs mâles et des fleurs femelles. Les premières à apparaître sont les mâles reconnaissables aux longues tiges sur lesquelles elles poussent. Les femelles se reconnaissent grâce au renflement présent sous la fleur. C'est là que le fruit va se former. Depuis plusieurs années les pollinisateurs sont en déclin et il arrive que la fécondation ne soit pas faite. Si le fruit commence à se former puis dépérit très rapidement c'est qu'elle n'a pas eu lieu. Planter des fleurs à proximité pour attirer les pollinisateurs ou féconder les de manière manuel en appliquant le pollen de la fleur mâle à l'intérieur de la fleur femelle. Le meilleur moment est le matin après l'ouverture. Une fleur mâle peut polliniser plusieurs femelles. Concernant l'oïdium reconnaissable par ses tâches circulaires blanches sur les feuilles il est dû à deux champignons qui se développent quand il fait chaud et humide. Sous tunnel pensez à bien aérer. Dès l'apparition des tâches supprimer les parties atteintes puis pulvériser une décoction de prêle ou de lait de vache dilué à 10 % (1L de lait pour 10L d'eau). La récolte s'effectue environ 2 mois après plantation pour les plus précoces. Elle se fait fréquemment : tous les deux jours en pleine saison. Quand les fruits sont jeunes ils n'y a pas besoin de les éplucher.

### EMPLACEMENT

#### Emplacement de COURGETTE 'Black Beauty'

#### Type de sol de COURGETTE 'Black Beauty'

### PARTICULARITÉ

COURGETTE 'Black Beauty' est une plante à feuillage persistant.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

-> [Accéder à la collection des Toutes les plantes disponible à la vente sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)